Капсулы Цитовир-3 Краткая инструкция по применению

В этой инструкции приведена краткая информация о том, как и когда принимать препарат Цитовир-3 в форме капсул. Следует помнить, что любой лекарственный препарат имеет особенности применения: взаимодействие с другими препаратами, пищей и напитками, меры предосторожности и возможные нежелательные реакции.

Перед применением препарата рекомендуем ознакомиться с полным текстом инструкции – листком-вкладышем для пациента, вложенным в упаковку. Полный текст инструкции также приведён на сайте cytovir.ru в разделе «Инструкции».

Всегда принимайте препарат, соблюдая инструкцию и рекомендации лечащего врача.

Показания к применению:

Профилактика и комплексная терапия гриппа и ОРВИ

Возрастные ограничения:

Для детей с 6 лет и взрослых

Противопоказания:

Аллергия на действующие вещества (альфа-глутамил-триптофан, аскорбиновая кислота, бендазол) или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша)

Беременность

Особые указания и меры предосторожности:

- Перед приёмом препарата Цитовир-3 проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, если у вас непереносимость некоторых сахаров (препарат содержит лактозу).
- Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы или ваш ребёнок принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Препарат Цитовир-3 можно принимать одновременно с противовирусными препаратами и средствами симптоматической терапии гриппа и ОРВИ. Взаимодействие при одновременном приёме с другими лекарственными препаратами описано в листке-вкладыше для пациента (в полном тексте инструкции).
- Не принимайте препарат со щелочными напитками (гидрокарбонатными минеральными водами) и свежими соками.
- В случае, если вы или ваш ребёнок приняли большее количество препарата Цитовир-3, чем следовало, прекратите приём препарата и немедленно обратитесь к врачу.



Способ применения и дозы:

Для приёма внутрь

Лечение:
по одной капсуле — 3 раза в день — за 30 минут до еды — 4 дня

Профилактика при непосредственном контакте с больными гриппом и другими ОРВИ:
по одной капсуле — 3 раза в день — за 30 минут до еды — 4 дня

Профилактика в период эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и другими ОРВИ:
по одной капсуле — 1 раз в день — за 30 минут до еды — 12 дней

Профилактические курсы, при необходимости, повторяют через 3 недели (до нормализации эпидемической обстановки)

Если вы забыли принять препарат:

При пропуске дозы рекомендуется продолжить приём по схеме, указанной в инструкции, не увеличивая дозу и курс. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Возможные нежелательные реакции:

Подобно всем лекарственным препаратам Цитовир-3 может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите приём препарата и обратитесь за медицинской помощью при появлении следующих нежелательных реакций:

Аллергическая реакция: зуд и покраснение кожи с появлением пузырей, волдырей (крапивница)

Кратковременное снижение артериального давления

Как хранить препарат:

- В недоступном для ребёнка месте, так, чтобы ребёнок не мог увидеть его.
- Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на флаконе и картонной пачке после «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.
- Хранить при температуре не выше 25 °С.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.