

Цитовир-3 порошок для приготовления раствора для приёма внутрь

Краткая инструкция по применению




В этой инструкции приведена краткая информация о том, как и когда принимать препарат Цитовир-3 в форме порошка для приготовления раствора для приёма внутрь. Следует помнить, что любой лекарственный препарат имеет особенности применения: взаимодействие с другими препаратами, пищей и напитками, меры предосторожности и возможные нежелательные реакции.

Перед применением препарата рекомендуем ознакомиться с полным текстом инструкции – листком-вкладышем для пациента, вложенным в упаковку. Полный текст инструкции также приведён на сайте cytovir.ru в разделе «Инструкции».

Всегда принимайте препарат, соблюдая инструкцию и рекомендации лечащего врача.


Показания к применению:

 Профилактика и комплексная терапия гриппа и ОРВИ

Возрастные ограничения:

 Для детей от 1 года

Противопоказания:

 Аллергия на действующие вещества (альфа-глутамил-триптофан, аскорбиновая кислота, бендазол) или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша)

 Беременность

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применяйте при сахарном диабете и артериальной гипотензии.

Заблаговременно проконсультируйтесь с врачом. Содержание сахаров в разовой и суточной дозах препарата приведено в листке-вкладыше для пациента (в полном тексте инструкции).

Перед приёмом препарата Цитовир-3 проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, если у вас непереносимость некоторых сахаров (препарат содержит лактозу и фруктозу).

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы или ваш ребёнок принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Препарат Цитовир-3 можно принимать одновременно с противовирусными препаратами и средствами симптоматической терапии гриппа и ОРВИ. Взаимодействие при одновременном приёме с другими лекарственными препаратами описано в листке-вкладыше для пациента (полном тексте инструкции).

Не принимайте препарат со щелочными напитками (гидрокарбонатными минеральными водами) и свежими соками.

В случае, если вы или ваш ребёнок приняли большее количество препарата Цитовир-3, чем следовало, прекратите приём препарата и обратитесь к врачу.



Способ применения и дозы:

Для приёма внутрь



Лечение или профилактика при непосредственном контакте с больными гриппом и другими ОРВИ:

- ✦ Для детей в возрасте от 1 до 3 лет — по 2 мл 3 раза в день за 30 минут до еды.
- ✦ Для детей в возрасте от 3 до 6 лет — по 4 мл 3 раза в день за 30 минут до еды.
- ✦ Для детей в возрасте от 6 до 10 лет — по 8 мл 3 раза в день за 30 минут до еды.
- ✦ Для детей в возрасте старше 10 лет — по 12 мл 3 раза в день за 30 минут до еды.



Курс — 4 дня

- ✦ Профилактические курсы, при необходимости, повторяют через 3 недели (до нормализации эпидемической обстановки).



Правила приготовления раствора

Во флакон с порошком добавить 40 мл воды (кипячёной, охлаждённой до комнатной температуры), хорошо взболтать. Содержимое должно полностью раствориться. Объём раствора после добавления воды — 50 мл.

На заметку: объём одного флакона порошка рассчитан на один полный курс лечения или профилактики для детей с 1 года до 6 лет. С 6 лет возможен приём капсул Цитовир-3


Если вы забыли


принять препарат:

При пропуске дозы рекомендуется продолжить приём по схеме, указанной в инструкции, не увеличивая дозу и курс. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Возможные нежелательные реакции:

Подобно всем лекарственным препаратам Цитовир-3 может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

 Возможно кратковременное снижение артериального давления

 Возможны аллергические реакции: крапивница

В этих случаях применение препарата прекращают и назначают симптоматическое лечение, антигистаминные средства.

Как хранить препарат:

- ✓ В недоступном для ребёнка месте, так, чтобы ребёнок не мог увидеть его.
- ✓ Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на флаконе и картонной пачке после «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.
- ✓ Порошок хранить при температуре не выше 25 °С.
- ✓ Приготовленный раствор хранить в защищённом от света месте при температуре от 2 °С до 8 °С.
- ✓ Срок годности приготовленного раствора 10 суток.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.