Цитовир-3 сироп
Краткая инструкция по применению



В этой инструкции приведена краткая информация о том, как и когда принимать препарат Цитовир-3 в форме сиропа. Следует помнить, что любой лекарственный препарат имеет особенности применения: взаимодействие с другими препаратами, пищей и напитками, меры предосторожности и возможные нежелательные реакции.

Перед применением препарата рекомендуем ознакомиться с полным текстом инструкции – листком-вкладышем для пациента, вложенным в упаковку. Полный текст инструкции также приведён на сайте cytovir.ru в разделе «Инструкция».

Всегда принимайте препарат, соблюдая инструкцию и рекомендации лечащего врача.

Показания к применению:

Профилактика и комплексная терапия гриппа и ОРВИ

Возрастные ограничения:

Для детей от 1 года

Противопоказания:

Аллергия на действующие вещества (альфа-глутамил-триптофан, аскорбиновая кислота, бендазол) или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша)

Беременность

Сахарный диабет

Особые указания и меры предосторожности:

- При наличии артериальной гипотензии заблаговременно проконсультируйтесь с врачом.
- Перед приёмом препарата Цитовир-3 проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, если у вас или вашего ребенка непереносимость некоторых сахаров (препарат содержит сахарозу).
- Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы или ваш ребёнок принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Препарат Цитовир-3 можно принимать одновременно с противовирусными препаратами и средствами симптоматической терапии гриппа и ОРВИ. Взаимодействие при одновременном приёме с другими лекарственными препаратами описано в листке-вкладыше для пациента (в полном тексте инструкции).
- Не принимайте препарат со щелочными напитками (гидрокарбонатными минеральными водами) и свежими соками.
- В случае, если вы или ваш ребёнок приняли большее количество препарата Цитовир-3, чем следовало, прекратите приём препарата и обратитесь к врачу.



Способ применения и дозы:

Для приёма внутрь

Лечение или профилактика при непосредственном контакте с больными гриппом и другими ОРВИ:

- Для детей в возрасте от 1 до 3 лет — по 2 мл сиропа 3 раза в день за 30 минут до еды.
- Для детей в возрасте от 3 до 6 лет — по 4 мл 3 раза в день за 30 минут до еды.
- Для детей в возрасте от 6 до 10 лет — по 8 мл 3 раза в день за 30 минут до еды.
- Для детей в возрасте старше 10 лет — по 12 мл 3 раза в день за 30 минут до еды.

***Курс** — 4 дня*

- Профилактические курсы, при необходимости, повторяют через 3 недели (до нормализации эпидемической обстановки).

На заметку: объём одного флакона сиропа рассчитан на один полный курс лечения или профилактики для детей с 1 года до 6 лет. С 6 лет возможен приём капсул Цитовир-3

Если вы забыли принять препарат:

При пропуске дозы рекомендуется продолжить приём по схеме, указанной в инструкции не увеличивая дозу и курс.
Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Возможные нежелательные реакции:

Подобно всем лекарственным препаратам Цитовир-3 может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможно кратковременное снижение артериального давления

Возможны аллергические реакции: крапивница

В этих случаях приём препарата прекращают и назначают симптоматическое лечение, антигистаминные средства.

Как хранить препарат:

- В недоступном для ребёнка месте, так, чтобы ребёнок не мог увидеть его.
- Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на флаконе и картонной пачке после «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.
- Хранить при температуре не выше 25 °С.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.